













Рекомендации по агротехнике растений основного ассортимента

Если у Вас появятся дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите нам на почту
rhodo-shop@ya.ru



Название растения	Латинское название	Отношение к освещению	Водный режим	Состав почвы	Дополнительные условия	USDA зона
						
Адиантум стоповидный 	<i>Adiantum pedatum</i>	Тень, полутень	Умеренный полив, не выносит застоя влаги	Плодородные рыхлые слабокислые почвы.	-	4 (-34 °C)
Буковник обыкновенный 	<i>Phegopteris connectilis</i>	Тень, полутень	Регулярный полив	Рыхлые, увлажненные лесные почвы. Все папоротники не переносят навоз и компост	Вид с ползучим корневищем	2 (-45 °C)
Вудсия многорядниковая 	<i>Woodsia polystichoides</i>	Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце	Умеренный полив, не выносит застоя влаги	Слабокислая или нейтральная рыхлая почва, с добавкой крупнозернистого песка	Скальный папоротник, дренаж обязателен	2 (-45 °C)

<p>Вудсия эльбская</p> 	<p><i>Woodisia ilvensis</i></p>	<p>Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце</p>	<p>Умеренный полив, не выносит застоя влаги</p>	<p>Слабокислая или нейтральная рыхлая почва, с добавкой крупнозернистого песка</p>	<p>Скальный папоротник, дренаж обязателен</p>	<p>2 (-45 °С)</p>
<p>Голокучник обыкновенный</p> 	<p><i>Gymnocarpium dryopteris</i></p>	<p>Тень, полутень</p>	<p>Регулярный полив</p>	<p>Легкие торфяные почвы. Все папоротники не переносят навоз, компост и тому подобные смеси</p>	<p>Вид с ползучим корневищем</p>	<p>2 (-45 °С)</p>
<p>Костенец зелёный</p> 	<p><i>Asplenium viride</i></p>	<p>Тень, полутень</p>	<p>Умеренный полив, не выносит застоя влаги</p>	<p>Слабокислая или нейтральная рыхлая почва, с добавкой крупнозернистого песка</p>	<p>Скальный папоротник, дренаж обязателен</p>	<p>3 (-40 °С)</p>
<p>Костенец надрезанный</p> 	<p><i>Asplenium incisum</i></p>	<p>Тень, полутень</p>	<p>Умеренный полив, не выносит застоя влаги</p>	<p>Слабокислая или нейтральная рыхлая почва, с добавкой крупнозернистого песка</p>	<p>Скальный папоротник, дренаж обязателен</p>	<p>3 (-40 °С)</p>
<p>Костенец настенный</p> 	<p><i>Asplenium ruta-muraria</i></p>	<p>Тень, полутень</p>	<p>Умеренный полив, не выносит застоя влаги</p>	<p>Слабокислая или нейтральная рыхлая почва, с добавкой крупнозернистого песка</p>	<p>Скальный папоротник, дренаж обязателен</p>	<p>4 (-34 °С)</p>

<p>Кочедыжник альпийский</p> 	<p><i>Athyrium distentifolium</i></p>	<p>Полутень, при достаточном увлажнении - на полном солнце</p>	<p>Регулярный полив</p>	<p>Легкие торфяные почвы. Все папоротники не переносят навоз, компост и тому подобные смеси</p>	<p>-</p>	<p>1 (ниже 45 °С)</p>
<p>Кочедыжник женский</p> 	<p><i>Athyrium filix-femina</i></p>	<p>Тень, полутень</p>	<p>Умеренный полив</p>	<p>Легкие торфяные почвы. Все папоротники не переносят навоз, компост и тому подобные смеси</p>	<p>-</p>	<p>4 (-34 °С)</p>
<p>Многоножка обыкновенная</p> 	<p><i>Polypodium vulgare</i></p>	<p>Тень</p>	<p>Умеренный полив, не выносит застоя влаги</p>	<p>Слабокислая или нейтральная рыхлая почва, с добавкой крупнозернистого песка</p>	<p>Скальный папоротник, дренаж обязателен</p>	<p>4 (-34 °С)</p>
<p>Оноклея чувствительная</p> 	<p><i>Onoclea sensibilis</i></p>	<p>Тень, полутень</p>	<p>Умеренный полив</p>	<p>Рыхлые, увлажненные лесные почвы. Все папоротники не переносят навоз и компост</p>	<p>Длиннокорневищный папоротник. Отличается относительно глубоко расположенным (8-12 см) ветвящемся корневищем.</p>	<p>3 (-40 °С)</p>
<p>Пузырник ломкий</p> 	<p><i>Cystopteris fragilis</i></p>	<p>Тень, полутень</p>	<p>Умеренный полив</p>	<p>Предпочитает глинистую и известковую почву</p>	<p>Скальный папоротник, дренаж обязателен</p>	<p>2 (-45 °С)</p>

<p>Страусник обыкновенный</p> 	<p><i>Matteuccia struthiopteris</i></p>	<p>Тень, полутень</p>	<p>Регулярный полив</p>	<p>Любые окультуренные и питательные почвы</p>	<p>Вид с ползучим корневищем</p>	<p>2 (-45 °С)</p>
<p>Чистоусник азиатский</p> 	<p><i>Osmundastrum asiaticum</i></p>	<p>Тень, полутень</p>	<p>Регулярный полив</p>	<p>Плодородные рыхлые, регулярно увлажняемые почвы</p>	<p>Корневищный высокий (до 100 см) папоротник</p>	<p>4 (-34 °С)</p>
<p>Щитовник мужской</p> 	<p><i>Dryopteris filix-mas</i></p>	<p>Тень</p>	<p>Регулярный полив</p>	<p>Любые окультуренные и питательные почвы</p>	<p>-</p>	<p>2 (-45 °С)</p>